



Rosa Nivea.

P. J. Redouté pinx.

Rosier blanc de Neige.

Superiori de Bernard

Longfleur sculp.

LES ROSES.

81

ROSA NIVEA.⁽¹⁾

R. Calycum tubis ovatis subhispidis, pedunculo glabriusculo foliis brevioribus, solitario, foliolis 3, rarius 5, lanceolatis lucidis perennantibus, subtus petiolisque aculeatis, foliis in apice ramulorum sub flore congestis. D.C. *Cat. hort. monsp.* 137, n° 181. ⁽²⁾

R. Macartnea. DUM.-DE-COURS. *Bot. Cultiv.* ed. 1, vol. 3, p. 351? Non ed. 2.

R. Trifoliata hortul.

LE ROSIER BLANC DE NEIGE.

DESCRIPTION.

RACINES rameuses, ligneuses, un peu traçantes sous terre.

TIGES un peu dressées, disposées en touffe bêche, rameuses, sans aiguillons, s'élevant à peine à deux pieds (3), divisées en branches glabres, nombreuses, garnies d'un petit nombre d'aiguillons épars, grossiers, comprimés et dilatés en long à leur base, amincis, crochus, et aigus à leur sommet.

FEUILLES nombreuses, surtout sous les fleurs, vers le sommet des rameaux, parfaitement glabres, luisantes, d'un vert gai, composées de trois, rarement de cinq folioles.

STIPULES étroites, presque linéaires, bordées de dents en scie, légèrement glanduleuses.

PÉTIOLÉ demi-cylindrique, noué, en-dessous, de un à quatre aiguillons courts et à-peu-près droits.

FOLIOLES partant toutes trois du sommet lorsqu'il n'y en a que trois, disposées à la manière des feuilles pinnées lorsqu'il y en a cinq, ovales-lancéolées, simplement dentées en scie, minces, en-dessous, de quelques aiguillons droits sur la côte moyenne, portées sur un pétiole très-court dans les folioles latérales, un peu plus long dans celles du sommet.

PÉDONCULES solitaires au sommet de petites branches feuillées, latérales ou rarement terminales, ne portant jamais qu'une seule fleur, un peu plus courts que les feuilles qui

(1) Cet article a été entièrement rédigé par M. DE CARVILLE. Les notes seules appartiennent à l'éditeur.

(2) *R. Nivea*, FORST. *Ency. Supp.* in tome IV, n° petit, p. 303, n° 54. *Id.* *R. Trifolia*, *Ency.* vol. 4, n° 113 et 114.

R. (Lewigii), glaberrima, nigerrima, aculeata; folioli 3-5, foliolis, subcordatis; stipulis oppositis, mucronatis adnatis; calyce ovato, promissa hispido; sepalis longis. MICHX. *Fl. Bor. Amer.* vol. 1, p. 245. *Reich. North-Am.* vol. 1, p. 246, n° 10.

(3) Dans le climat de Paris, l'arbuste, même en pleine terre, monte à plus de dix pieds. En 1807, il couvrait un bosquet du jardin de M. BOURSAULT, à Verres; il y a fleuri cette même année. Dans l'été de 1818, il s'est élevé à quinze yards, au moins, dans la serre tempérée de M. RANOUX, à Fleury; mais il n'a jamais montré ses roses.